

FORME COMMERCIALE USUELLE DES PRINCIPAUX RÉACTIFS				GE 15 - 5	
	Formule du produit pur	Densité	Degrés Baumé	Concentration % en poids ou g/l	
Acides					
Acide chlorhydrique	HCl	1,18	22	35,4	% HCl
Acide nitrique	HNO ₃	1,35-1,36	38	56-58	% HNO ₃
Acide phosphorique	H ₃ PO ₄	1,45	45	45	% P ₂ O ₅
Acide phosphorique	H ₃ PO ₄	1,72	60	61	% P ₂ O ₅
Acide sulfurique	H ₂ SO ₄	1,83	65,5	92,3	% H ₂ SO ₄
Acide sulfurique	H ₂ SO ₄	1,84		98	% H ₂ SO ₄
Bases					
Chaux	CaO	vive en roches ou en poudre		80-95	% CaO
Chaux	Ca(OH) ₂	blutée en poudre		85-97	% Ca(OH) ₂
Soude	NaOH	écailles - coulée		98	% NaOH
Soude - Solution 35 %		1,38	40	485	g/l NaOH
Soude - Solution 41 %		1,45	45	590	g/l NaOH
Soude - Solution 47 %		1,50	48,5	715	g/l NaOH
Réactifs de clarification					
Chlorure ferrique	FeCl ₃ .6H ₂ O	cristallisé		60	% FeCl ₃
Chlorure ferrique	FeCl ₃	cristallisé		99	% FeCl ₃
Chlorure ferrique - Solution 39-41 %	FeCl ₃	1,41-1,45	41,45	596	g/l FeCl ₃
Chlorosulfate ferrique	FeClSO ₄	1,6		594	g/l FeCl ₃
Chlorure basique d'aluminium (WAC)	Al _n (OH) _m Cl _{3n-m}	1,2		10	% Al ₂ O ₃
Sulfate d'aluminium	Al ₂ (SO ₄) ₃ .18H ₂ O	cristallisé		17,2	% Al ₂ O ₃
Sulfate d'aluminium - Solution 7,5-8,5 %		1,3	34	8,3	% Al ₂ O ₃
Silicate de sodium	nSiO ₂ .Na ₂ O	cristallisé		60	% SiO ₂
Silicate de sodium - Solution 25 %		1,33	36	330	g/l SiO ₂
Silicate de sodium - Solution 28 %		1,37	39	380	g/l SiO ₂
Décarbonatation - Désiliclage					
Aluminate de sodium	1,4 Na ₂ O, Al ₂ O ₃ , nH ₂ O	1,48	46	21	% Al ₂ O ₃
Aluminate de sodium		cristallisé		40	% Al ₂ O ₃
Carbonate de sodium	Na ₂ CO ₃	poudre		99	% Na ₂ CO ₃
Carbonate de sodium	Na ₂ CO ₃ , 10H ₂ O	cristaux		36	% Na ₂ CO ₃
Chlorure de magnésium	MgCl ₂ , 6H ₂ O	cristallisé		19	% MgO
Magnésie	MgO	poudre		98	% MgO
Désinfection					
Chlorite de sodium	NaClO ₂	cristallisé		80	% NaClO ₂
Chlorite de sodium		1,15	20	375	g/l Cl ₂ actif
Solution 25 %				300	g/l NaClO ₂
Chlorite de sodium		1,05	7	112	g/l Cl ₂ actif
Solution 7,5 %			30	90	g/l NaClO ₂
Extrait de Javel - 47-50° chlorométrique	NaClO			149-159	g/l Cl ₂ actif
Hypochlorite de calcium	Ca(ClO) ₂	cristallisé		env. 600	g/kg Cl ₂ actif
Conditionnement					
Bisulfite de sodium	NaHSO ₃	1,32	35	23-24	% SO ₂
Métabisulfite de sodium	Na ₂ S ₂ O ₅	cristallisé		60-62	% SO ₂
Phosphate disodique	Na ₂ HPO ₄ , 12H ₂ O	cristallisé		20	% P ₂ O ₅
Phosphate trisodique	Na ₂ PO ₄ , 12H ₂ O	cristallisé		20	% P ₂ O ₅
Phosphate trisodique anhydre	Na ₃ PO ₄	cristallisé		40	% P ₂ O ₅
Sulfite de sodium	Na ₂ SO ₃ , 7H ₂ O	cristallisé		23-24	% SO ₂
Sulfite de sodium, anhydre	Na ₂ SO ₃	cristallisé		48	% SO ₂
Divers					
Chlorure d'aluminium	AlCl ₃ , 6H ₂ O	cristallisé		20	% Al ₂ O ₃
Sel marin	NaCl	cristallisé		97	% NaCl